

Barbier (Anthias anthias)



Synonyme : castagnole rouge

Famille : serranidés

Corps : aplati latéralement.

Tête : au profil obtus, avec 3 épines sur l'opercule et 3 à 4 lignes jaunes sur les côtés ; yeux cerclés de bleu.

Nageoires : pelviennes très allongées ; caudale profondément échancrée ; troisième rayon de la dorsale plus allongé que les autres, notamment chez le mâle.

Coloration : rose vif plus ou moins orangé.

Taille : 25 cm maximum.

Biologie : En été, le barbier se rencontre de 8 à 40 m de profondeur. Il vit en bancs sédentaires, parfois importants, à l'entrée des grottes et anfractuosités rocheuses, ou autour de épaves. En hiver, il regagne les profondeurs jusqu'à 200 m. Il se nourrit de crustacés et de petits poissons, capturant le plancton en pleine eau. La ponte a lieu au printemps.

Pêche : au filet, à la nasse et à la ligne (palangrotte).

Intérêt culinaire : comestible, sans plus.

Ma note perso : ces poissons colonisant grottes et anfractuosités, n'attendez pas à voir d'autres poissons tels que congres, murènes, mostèles ou scorpanéidés, qui ont pour habitude d'habiter les mêmes lieux.