

## *Lépadogaster* (*Lepadogaster*, *Apletodon* et *Diplecogaster*)



Lépadogaster à petite tête



Lépadogaster à deux taches



Lépadogaster de De Candolle



Lépadogaster de Gouan

**Synonyme :** porte-écuelle.

**Famille :** gobiésocidés

**Corps :** aplati dans sa partie antérieure, recouvert d'une peau lisse sans écailles.

**Tête :** très large à museau pointu ; bouche largement fendue ; yeux dorsaux ; petit appendice aux narines antérieures suivant les espèces.

**Nageoires :** dorsale et anale allongées, bien séparées de la caudale ; pelviennes transformées en une large ventouse ventrale.

**Coloration :** variable : verdâtre à brunâtre, tachée ou marbrée de sombre sur le dos et les flancs.

**Taille :** 5 à 12 cm.

**Biologie :** Ce petit poisson vit sur les fonds rocheux, les fonds de graviers coralligènes, la base des herbiers ou sous les rochers auxquels il se fixe par sa ventouse ventrale. On peut l'observer de la surface jusqu'à 100 m de profondeur. Carnivore, il se nourrit d'invertébrés benthiques. Au printemps et en été, on peut voir les mâles garder les œufs fixés par des minces filaments sous un rocher, dans une cavité, ou sur la face inférieure d'une pierre ou d'une coquille.

**Pêche :** épuisette.

**Intérêt culinaire :** aucun.

**Ma note perso :** Petits poissons peu farouches, collés grâce à leur ventouse sur les rochers, même quand il y a du ressac, observables à faible profondeur, donc idéaux pour ceux qui s'initient à la découverte et à la photographie du monde sous-marin.