

Mendole (Spicara maena)



Synonyme : aucun ; confusion possible avec le **picarel** (*Spicara Smaris*) et le **gerle** (*Spicara flexuosa*), ce dernier ayant des proportions intermédiaires et une indentation au milieu de la dorsale.

Famille : maénidés

Corps : assez allongé, comprimé latéralement, avec 63-73 écailles le long de la ligne latérale.

Tête : bouche très protractile ; front légèrement bossu chez les gros individus.

Nageoires : une dorsale à bord supérieur continu et une anale.

Coloration : gris bleuté, plus clair sur le ventre ; une tâche noire rectangulaire sur les flancs ; les mâles ont le corps et la tête parsemés de points bleus.

Taille : 25 cm.

Biologie : Ce poisson vit en bancs, en pleine eau, au dessus des fonds rocheux et des herbiers, littoral en été et jusqu'à 200 m de profondeur en hiver. La mendole se nourrit de petits crustacés planctoniques. Hermaphrodite, ce poisson passe d'abord par une phase femelle, puis une phase mâle. La ponte a lieu entre août et octobre, dans un nid creusé dans le sable par le mâle.

Pêche : filet dormant et ligne.

Intérêt culinaire : chair peu appréciée, éventuellement en friture.

Ma note perso : Sans intérêt pour le chasseur sous-marin ; d'ailleurs, jadis, traiter quelqu'un de « mange-mendole » était considéré comme une grave injure !