

Torpille ocellée (*Torpedo torpedo*)



Synonyme : aucun

Famille : torpéidinidés

Corps : discoïde, assez épais ; queue courte et robuste sans aiguillon.

Tête : éventails ovales bordés de 6 à 8 tentacules.

Nageoires : deux dorsales disposées sur la partie postérieure de la queue ; grandes pelviennes arrondies ; caudale bien développée.

Coloration : corps brun-roux, tachée de blanc, avec 5 ocellus bleutés, cerclés de noir. La **torpille marbrée** est marbrée ou tachetée de sombre. La **torpille noire** est brun chocolat.

Taille : 50 cm.

Biologie : Cette espèce s'observe sur les fonds meubles, sableux ou sablo-vaseux où elle s'enfouit à moitié, entre la côte et 200 m de profondeur. Elle se nourrit de poissons qu'elle paralyse grâce à une décharge électrique intense produite par deux gros organes gélatineux situés de part et d'autre de la tête. Ovo-vivipares, les femelles mettent bas en été au bout de 4 semaines de gestation, une vingtaine de petits.

Pêche : chalut pélagique.

Intérêt culinaire : chair molle, rouge foncé, peu prisée.

Ma note perso : Attention à la décharge électrique d'une équivalence de 40 à 200 volts, qui, si elle est très désagréable, est néanmoins sans danger.